


Harangvirág 36

képsorozatok kirándulásokról, túrákról

KIRÁLYRÉT - KŐBÁNYA

Királyrét Szokolya településrésze, kirándulóközpont, túraútvonalak kiinduló- és metszéspontja, az erdei kisvasút egyik végállomása. Vendégházunktól 7 km az út Királyrétre.

Aki autóval vagy kisvonattal érkezik Királyrétre, és nem akar nagyobb túrát tenni, annak érdemes megnéznie a régi kőbányát, az út erdőben tavak mellett visz oda.



Harangvirág 36 Vendégház / Faház / Apartman

2623 Kismaros, Harangvirág u. 36

www.harangvirag36.hu

harangvirag36@gmail.com

+36 27 350790

+36 30 9616552


Krajnik István, Bódis Ágnes

Királyrét központ

B

Kismaros
Harangvirág u. 36.

A





Madaras-fa

391

Bajdázói
köbánya

Petőfi-f.

Bajdázói-tó

Királyréti-tó

Szabadidőközpont

D. I. N. P. borszónyi
fogadó épülete

Kastélyszálló


Hubertus-f.

Héverlyuk

Várhegy
359

Szeles-mező

Királyréti



BAJDÁZÓI KŐBÁNYA ÉS TERMÉSZETES FELTÁRÁSOK, SZOKOLYA-KIRÁLYRÉT, BÖRZSÖNY

Geológia: A Királyrét (régebben: Szokolyahuta) feletti Bajdázói kőbányában miocén korú, biotitban dús, padoson törő vasas andezitet, dácitot fejtenek. A kőfejtő időszakosan, de 2007-ig biztosan üzemelt. 1912-ben az andezit szállítására még vasúti szárnyvonal is épült, azt viszont már rég felszedték. A község honlapján rendezvényeket hirdetnek a bányában, így lehetséges, hogy már végleg megszűnt. A Királyrét környéki patakok hordalékában (elsősorban a Szén-pataokban) az Ajta-berek és a Szalatnya közötti területen, valamint a felszíni sziklakibúvások alján is találhatunk kimállott szilikátokat és szép faopálokat.

Leírás: A Bajdázói kőbánya - útközbeni kutatással - megközelíthető a Királyréti parkolóból (ami egyébként a régi vaskohó helyére épült) a Kulcsosház felé tartó útról kb. 500 méterre a bánya felé lekanyarodva egy erdei úton, vagy közvetlenül (kb. 400 méteres sétával) a Királyréti- és Bajdázói tó mentén, a Suta-berki nyiladékhöz vezető turistaúton gyalogolva.

Gyűjtési engedély valószínűleg már nem szükséges, de a falak omlásveszélyesek, ne másszunk fel. A Börzsöny teljes területe természetvédelem alatt áll, ásást mellőzzünk.

Ásvány	Fotó	Ásvány megjelenése a lelőhelyen
almandin (gránát csoport)	5	rózsaszíntől sötétvörösig, 1-20 mm-es kristályok, fenokristályok az andezitben, ill. a patakhordalékban, ill. kimállottan az úton
augit (piroxének)	0	2-5 mm-es fekete oszlopos kristályok, szemcsék, kimállva a patakhordalékban is
biotit sor	3	a kőbányában fejtett kőzetek kőzetalkotója, 1-3 mm-es sötétbarna, csillogó táblás fenokristályok, kimállva (általában töredezetten) a patakhordalékban is található
diopszid (piroxének)	0	Sötétzöld, 1-3 mm-es oszlopos kristályok a patakhordalékban
goethit	0	barna földes tömegek, kérgék, foltok, a kőbányában található kőzetet barnára festi, a faopálok egy részét is
hematit	0	vörös porszerű halmazok, foltok, fekete kérgék, egyes andezittufákban 1 mm körüli táblás fekete kristályok
klinoamfibolok	0	hornblende 1-3 mm-es zöldes-, ill.- barnás-fekete fenokristályai, kimállva a patakhordalékban is
kvarc	2	a kovás fák alapanyaga
kvarc (hegyikristály)	0	kovás fákban lévő repedéseket tölthet ki, 1 mm körüli kristályokban jelenik meg
kvarc (kalcedon)	1	kovás fákban gömbös-vesés bevonatokat képez az üregekben, repedésekben
mangánoxidok	0	fe fekete foltok, kérgék, dendritek, a faopálokat feketére festi
opál	6	faopálok és vasopálok fordulnak elő, elsősorban a Szén-patak felső szakaszánál (Ajta-berek és Szalatnya között), színük zöld, zöldes-barnás, barna, sárga, fekete vagy tarka, akár több dm-es darabok is
vasoxidok	1	be nem vizsgált sárgás-barna, vörös, fekete vasas foltok, kérgék, halmazok



















